

▪ **Indication :**

- Affirmer le diagnostic de diabète lorsqu'il y a un doute (glycémie à jeun comprise entre 1,10 g/l et 1,25 g/l)
- Exploration de certaines hypoglycémies
- Exploration de l'hypersécrétion des somatotrophines

▪ **Contre-indications :**

- Patient diabétique connu

▪ **Déroulement :**

- Effectuez une première prise de sang à jeun pour le dosage de la glycémie
- Ingestion de 75 g de glucose chez l'adulte par voie orale en 3 à 4 minutes maximum
- Attendre en salle de repos
- Prise de sang toutes les 30 minutes pendant 2h00 en standard soit 5 prélèvements sanguins au total- (possible sur 3h ou 5h selon la prescription)

▪ **Dosage**

Dosage de la glycémie à T0, T + 30 mn, T + 60 mn, T + 90 mn et T + 120 mn

▪ **Résultats**

	<b>Glycémie à jeun</b>		<b>Glycémie à 2 heures</b>		<b>Glycémies intermédiaires</b>
Normal	< 1.10 g/l	et	< 1.40 g/l	et	< 2g/l
Intolérance au glucose	≥ 1.10 et < 1.40 g/l	et	≥ 1.40 et < 2 g/l		
Diabète	> 1,25 g/l à plus de 2 reprises	et/ou	> 2 g/l	et /ou	1 ou plusieurs taux > 2 g/l